

事業年報 2023



長野県労働基準協会連合会
Nagano Labor Standards Association

は じ め に

平素より、一般社団法人長野県労働基準協会連合会松本健診所の事業運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当健診所は労働安全衛生法に基づく職域の健康診断を担う部門として昭和 57 年 3 月に松本市大手に開設し、その後松本市芳野への移転を経て、平成 14 年 3 月に現所在地の松本市神林に移転し現在に至っています。

本年度は設立から 42 年目を迎えております。この間多くの関係者の方々のご支援を賜りながら、地域で働く皆様の健康づくりに予防医学の観点から寄与したものと自負しております。

2020 年の東京オリンピックは無観客で開催されましたが、2024 年のパリオリンピックは多くの観客を動員し、華々しく開催されました。この違いは、新型コロナウイルスが初期のような致死率の高い病気ではなく、インフルエンザと同様の一般的な感染症として認識されるようになったことを示しています。これはワクチン開発の成果と考えられます。

2024 年 10 月から、高齢者向けのインフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの接種が開始されます。新型コロナワクチンには、レプリコンワクチンという新しい技術が採用されており、少量の接種で有効性と安全性が確認されています。インフルエンザと新型コロナはともに RNA ウイルスで、変異しやすく、再感染しやすい点が共通しており、新たなワクチンを接種する必要があるかもしれません。

このような中ではありますが、この度 2023（令和 5）年度の事業活動の実績がまとまりましたので「事業年報」として報告いたします。

この「事業年報」は、2023（令和 5）年度に当健診所において実施した事業所・団体の一般健康診断と特殊健康診断および職業性簡易ストレス調査を集計、分析したものです。一般健康診断は労働安全衛生法に基づいた検査項目別に、特殊健康診断は対象業務別に実績をまとめています。職業性簡易ストレス調査は業種別、年代別の集計と高ストレス者率等を記載しています。

この年報が受診者様の健康保持増進とともに、より良い職場環境を整えるための参考となれば幸いです。

今後も労働者の健康を守り、その福祉の向上と健全な産業の興隆に寄与するため健康診断を実施してまいりますので、引き続き皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。

2024（令和 6）年 9 月

一般社団法人長野県労働基準協会連合会松本健診所
所長 森泉 哲次

理念・基本方針

『労働者の福祉の増進をはかり健全な産業の興隆に寄与することを目的とする』

一般社団法人長野県労働基準協会連合会の理念のもとに松本健診所の業務は次のことを基本方針とする。

1. 労働安全衛生法及び関係法令に基づく健康診断を顧客（受診者等）ニーズに応じ完全かつ適正に実施する。
2. 労働者の健康を守る精神を基本とした健康診断、健康相談等の料金は営利を目的とせず適正な価格を設定する。
3. 職務上知り得る情報（医学上、技術上）は秘密を厳守する。
4. 健診業務等で生じる廃棄物の処理は確実に決められた処分に徹する。

個人情報に関する基本方針

一般社団法人長野県労働基準協会連合会は、個人情報及び特定個人情報（以下「個人情報」という。）を正確かつ安全に取り扱い保護することを社会的責務と捉え、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、宣言いたします。

1. 個人情報の取得・利用・提供

個人情報に関する個人の権利を尊重し、個人情報を保護・管理する体制の確立と適切な取得、利用および提供に関する内部規定を定め、これを遵守いたします。

2. 個人情報の安全対策

個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などが発生しないように万全の予防処置を講ずることで、個人情報の安全性・正確性の確保を図り、万一の問題発生には速やかな是正対策を実施いたします。

3. 個人情報に関する法令の遵守

個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守いたします。

4. 継続的改善

個人情報の保護体制を適切に維持するため、内部を継続的に見直し、改善に努めます。

制定 平成28年 1月 1日

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会

会長 塚 田 裕 一

お問合せは

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会 まで

TEL 026-223-0280（代） e-mail honbu@naganoroukiren.or.jp

目次

松本健診所の概要	1
健康診断結果報告	5
1. 一般健康診断実施概要	6
2. 一般健康診断結果集計	12
3. 特殊健康診断実施概要	29
4. 特殊健康診断結果集計	34
5. 異常値等の緊急連絡	38
ストレスチェック結果報告	40
1. 職業性ストレス簡易調査実施概要	41
2. 職業性ストレス簡易調査結果集計	43



松本健診所の概要

■ 松本健診所のあゆみ ■

松本健診所は昭和57年3月、松本市大手1丁目の三栄ビル内に事務所を開設。その後、昭和59年1月に松本市芳野に移転。

平成元年12月健康保持増進のサービス機関として認定を受け、健康測定、健康指導の業務を開始。平成11年11月労働衛生サービス機能評価機関として認定を受け、増大する業務の効率化と一層の充実を期し、平成14年3月に現在地へ新築移転、現在に至る。

＜健康管理も大事な仕事 毎年受けよう 健康診断＞

松本健診所では、巡回健診及び施設健診を行なっております。

健康管理のお手伝いは 当松本健診所へ お任せください。



■ 事業案内 ■

- | | |
|---|---|
| (1) 一般健康診断
雇入時健康診断
定期健康診断
特定業務従事者健康診断 | (4) オプション
胃検査・・・胃部X線、ペプシノーゲン、ピロリ菌抗体
便潜血検査(1回法、2回法)
PSA検査
尿検査・・・潜血、ウロビリノーゲン
肝炎ウイルス検査・・・HBs抗原・抗体、HCV抗体
眼底検査
腹部超音波検査
他 |
| (2) 特殊健康診断
有機溶剤健康診断
鉛健康診断
特定化学物質健康診断
石綿健康診断
高気圧業務健康診断
電離放射線健康診断
じん肺健康診断
騒音作業健康診断
情報機器作業健康診断 など | (5) ストレスチェック

(6) 産業保健支援サービス
保健指導、特定保健指導
健康教育 |

■ 有資格者数 ■

(2024年9月1日現在)

(1) 職種別

	常勤	非常勤	計
医 師	2	19	21
看護師・准看護師	4	7	11
保 健 師	2	1	3
臨床検査技師	8	3	11
診療放射線技師	5	3	8
計	21	33	54

(2) 特定有資格者

	常勤	非常勤	計
産 業 医	2	2	4
超音波検査士	3		3
胃がん検診専門技師	4		4
労働衛生コンサルタント(保健衛生)	1		1
第一種衛生管理者	3		3
選別聴力検査講習会修了者	5	4	9
計	18	6	24

■ 保有検診車一覧 ■

胸部検診車	2台
胃部・胸部検診車	3台
循環器検診車	3台
骨密度検診車	1台



■ 登録・認定等 ■

(1) 主な加盟団体


公益社団法人全国労働衛生団体連合会
中央労働災害防止協会
長野県事業場健康診断機関協議会

(2) 登録

全国労働衛生団体連合会総合精度管理調査参加機関
日本医師会臨床検査精度管理調査参加機関
長野県医師会臨床検査精度管理調査参加機関
全国健康保険協会健診実施機関

(3) 認定

労働衛生サービス評価機構
労働衛生サービス機能評価認定



<機関の名称等>

機関名 : 一般社団法人 長野県労働基準協会連合会 松本健診所
住所 : 〒390-1243 長野県松本市神林7107-55

担当部署 : 健康診断部 松本健診所
電話 : 0263(40)3911
FAX : 0263(40)3651
E-mail : kenshin@naganoroukiren.or.jp



健康診断結果報告

1. 一般健康診断実施概要

(学生健康診断含む)

1 - 1 実施事業所数

1 - 2 受診者数

1 - 3 判定区分

1 - 4 判定値一覧

1 - 1 実施事業所数


一般健康診断（学生含む）実施事業所数

事業所数…1879事業所

1 - 2 受診者数

一般健康診断（学生含む）受診者数 ※延べ数

	総数	男性	女性
～19歳	558	311	247
20～24歳	3,472	2,053	1,419
25～29歳	3,980	2,601	1,379
30～34歳	3,790	2,586	1,204
35～39歳	3,670	2,509	1,161
40～44歳	4,218	2,811	1,407
45～49歳	5,529	3,635	1,894
50～54歳	5,526	3,615	1,911
55～59歳	4,442	2,735	1,707
60～64歳	3,272	2,047	1,225
65歳～	3,668	2,458	1,210
計	42,125	27,361	14,764
平均年齢		45.3	45.1



1 - 3 判定区分

健康診断の結果は、松本健診所の判定基準に従って項目ごと以下のように区分しています。

＜総合判定及び各検査項目の主な判定＞

A：異常なし

B：軽度異常だが日常生活に問題なし

C：要経過観察

D：要精密検査

E：要治療

F：治療中

D・Eの判定がある方は、産業医の指示に従い精密検査をお受けください。

また今回正常範囲であった場合でも、気になる症状がある方は医療機関への受診をお願い致します。

＜各検査項目の詳細＞

〔聴力検査〕 オージオメーターもしくは会話法により、音の聞こえの程度を調べます。

A：異常なし

C：日常生活に支障がある場合は耳鼻科を受診しましょう。

〔胸部X線検査〕 肺や気管・心臓・大動脈などの異常が分かります。

A：異常なし

C：年に1回の定期検査で経過をみましょう。

D：精密検査を受けてください。

E：悪性病変や結核の可能性があるので早めに精密検査を受けてください。

〔胃部X線検査〕 胃・食道・十二指腸などの異常が分かります。

A：異常なし

C：年に1回の定期検査で経過をみましょう。

D：精密検査を受けてください。

E：悪性病変の可能性があるので早めに精密検査を受けてください。

〔心電図検査〕 心臓の筋肉（心筋）が動くときに生じる電流の変化を読みとり、心臓の異常を調べます。

A：正常範囲

B：境界域正常 軽度異常を認めますが健康管理上、特に問題はありません。

C：境界域異常 軽度異常を認めます。動悸・息切れなど自覚症状がある場合は受診をしましょう。

D：異常 精密検査を受けてください。

〔ABC検診〕 ペプシノーゲン（PG）検査結果とヘリコバクター・ピロリ菌（Hp）抗体価検査結果の組み合わせから、胃がんのリスクを分類します。

判定	分類	結果	胃の状態
A	A群	PG(－) Hp抗体(3.0未満)	健康的な胃粘膜です。
D	B群	PG(－) Hp抗体(3.0以上)	少し弱った胃粘膜です。
	C群	PG(＋) Hp抗体(3.0以上)	胃粘膜が萎縮しています。
	D群	PG(＋) Hp抗体(3.0未満)	萎縮が進んだ胃粘膜です。
－	E群	－	ピロリ菌除菌経験あり。

※Hp抗体価(U/mL)

〔眼底検査〕 眼底の血管や神経・網膜の異常を調べます。高血圧・動脈硬化・糖尿病などの全身状態も反映されます。

判定内容	A	B～E	
H所見（高血圧性変化）	0度	0度～4度	視神経乳頭・網膜等の変化や その他の所見
S所見（細動脈硬化性変化）	0度	0度～4度	

※上記の診断と医師の判断により、総合結果を以下のとおりとしています。

- A：異常なし（H所見／S所見 0度／0度 その他所見なし）
 B：僅かに異常を認めます。日常生活には支障はありません。
 C：僅かに異常を認めます。年に1回は様子をみましょう。
 D：異常を認めます。精密検査を受けてください。
 E：治療が必要です。

〔超音波検査（腹部）〕 断層画像により、肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓などの異常を調べます。

- A：特に異常は見当たりません。
 C：僅かに異常を認めます。年に1回は様子をみましょう。
 D：異常を認めます。精密検査を受けてください。

〔肝炎検査〕 採血によってB型・C型肝炎の有無を調べます。

種類	判定		内容
HBs抗原	陰性 (-)	陽性 (±) (+)	現在におけるB型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 陽性となった方は精密検査を受けてください。
HBs抗体	陰性 (-)	陽性 (±) (+)	過去におけるB型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 予防接種を受けた方も陽性となります。
HCV抗体	陰性 (-)	陽性 (+)	現在までのC型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。C型肝炎の既往がなく陽性となった方は精密検査を受けてください。

〔喀痰細胞診〕 肺や気管支などの細胞の悪性度を調べます。

判定	分類	内容
A	クラスⅠ	異型または異常な細胞を認めません。
	クラスⅡ	異型細胞を認めますが悪性所見はありません。
D	クラスⅢ	悪性の疑いのある異型細胞を認めますが、決定的に悪性とは断定できません。
E	クラスⅣ	悪性が強く疑われる異型細胞を認めます。
	クラスⅤ	決定的に悪性といえる異型細胞を認めます。

1 - 4 判定値一覧

	項目		A	B	C	D
計測	BMI		18.5～24.9		18.4以下 25.0以上	
	腹囲(cm)	男	84.9以下		85.0以上	
		女	89.9以下		90.0以上	
	血圧(mmHg)	収縮期	129以下	130～139	140～159	160以上
		拡張期	84以下	85～89	90～99	100以上
一般	尿糖 ^{※1}		(－)	(±)		(+) 以上
	尿蛋白 ^{※1}		(－)	(±)	(+)	(2+) 以上
	尿潜血		(－)	(±)	(+)	(2+) 以上
	尿ウロビリノーゲン		(±)		(+)	(2+) 以上
	便潜血		(－)			(+)
血液一般	赤血球数($10^4/\mu\text{L}$)	男	400～539	540～579	360～399 580以上	359以下
		女	360～489	490～519	330～359 520以上	329以下
	血色素量(g/dL)	男	13.1～16.3	16.4～18.0	12.1～13.0	12.0以下 18.1以上
		女	12.1～14.5	14.6～16.0	11.1～12.0	11.0以下 16.1以上
	ヘマトクリット(%)	男	38.0～48.9	49.0～51.9	35.0～37.9 52.0以上	34.9以下
		女	34.0～43.9	44.0～45.9	31.0～33.9 46.0以上	30.9以下
	白血球数(/ μL)		3,100～8,400	8,500～8,900	9,000～9,900	3,000以下 10,000以上
代謝	随時・空腹時血糖(mg/dL) ^{※2}		99以下	100～109	110～125	126以上
	食直後血糖(mg/dL) ^{※2}		125以下	126～139	140～199	200以上
	HbA1c (%) ^{※3}		5.5以下	5.6～5.9	6.0～6.4	6.5以上
	尿酸(mg/dL)		2.1～7.0	7.1～7.9	2.0以下 8.0～8.9	9.0以上
脂質	HDLコレステロール(mg/dL)		40以上		35～39	34以下
	LDLコレステロール(mg/dL)		60～119	120～139	140～179	59以下 180以上
	non-HDLコレステロール(mg/dL)		90～149	150～169	170～209	89以下 210以上
	中性脂肪(mg/dL)		30～149	150～299	300～499	29以下 500以上

	項目		A	B	C	D
肝機能	AST[GOT](U/L)		30以下	31～35	36～50	51以上
	ALT[GPT](U/L)		30以下	31～40	41～50	51以上
	γ-GT[γ-GTP](U/L)		50以下	51～80	81～100	101以上
	総蛋白(g/dL)		6.5～7.9	8.0～8.3	6.2～6.4	6.1以下 8.4以上
	総ビリルビン(mg/dL)		1.1以下		1.2～1.9	2.0以上
	LD(U/L) ^{※4}		229以下		230～349	350以上
	ALP(U/L) ^{※4}		119以下		120～157	158以上
	アルブミン(g/dL)		3.9以上		3.7～3.8	3.6以下
	A/G比		1.2～2.0(参考値)			
	コリンエステラーゼ(U/L)	男 女	235～494 196～452	139～234 495～637 117～195 453～585	138以下 638以上 116以下 586以上	
腎機能	尿素窒素(mg/dL)		8～22	23～27 7以下	28～31	32以上
	クレアチニン(mg/dL)	男 女	1.00以下 0.70以下	1.01～1.09 0.71～0.79	1.10～1.29 0.80～0.99	1.30以上 1.00以上
	eGFR(mL/分/1.73m ²)		60.0以上		45.0～59.9	44.9以下
	アミラーゼ(U/L)		50～200		201～250 49以下	251以上
胃	ペプシノーゲン		(-)	(+)		(2+) 以上
	ピロリ菌抗体価(U/mL)		10.0未満			10.0以上
他	PSA(ng/mL)		4.00以下			4.01以上

※1 生理中の尿蛋白・尿潜血については精密検査対象外とする。

※2 食後3.5時間未満を食直後、3.5～10時間未満を随時、10時間以上を空腹時とする。

※3 NGSP値。

※4 IFCC法。

2. 一般健康診断結果集計

(学生健康診断含む)

2 - 1 総合判定区分内訳(オプション項目等含む)

2 - 2 項目別判定区分内訳

2-1 総合判定区分内訳(オプション項目等含む)


総合判定区分の内訳は以下の表・グラフのとおりとなっている。

そのうち一般健康診断をみると、令和5年度の有所見率は59.0%（男性61.6%、女性54.3%）となり、令和4年度の有所見率57.2%（男性60.3%、女性51.7%）と比較して1.8ポイントの増加となった。厚生労働省による令和4年度の定期健康診断結果報告によると、有所見率は全国で58.2%、長野県で56.6%となっている。

	総数	A	B	C	D	E	F
男性							
～19歳	311	113	67	93	35	0	3
20～24歳	2,053	393	482	859	305	1	13
25～29歳	2,600	416	552	1,131	460	0	41
30～34歳	2,582	344	517	1,154	492	0	75
35～39歳	2,509	255	443	1,083	566	0	162
40～44歳	2,810	174	408	1,247	693	3	285
45～49歳	3,628	181	421	1,465	943	1	617
50～54歳	3,600	147	323	1,328	895	3	904
55～59歳	2,730	74	170	890	626	0	970
60～64歳	2,037	42	88	582	428	1	896
65歳～	2,418	23	33	508	416	2	1,436
小計	27,278	2,162	3,504	10,340	5,859	11	5,402
女性							
～19歳	247	115	41	76	13	0	2
20～24歳	1,419	436	252	572	141	0	18
25～29歳	1,379	348	244	567	196	0	24
30～34歳	1,203	244	193	545	190	1	30
35～39歳	1,159	182	172	527	246	0	32
40～44歳	1,407	161	230	616	318	0	82
45～49歳	1,892	136	279	816	468	0	193
50～54歳	1,909	100	237	824	398	3	347
55～59歳	1,706	67	156	698	322	0	463
60～64歳	1,224	42	91	451	212	0	428
65歳～	1,208	24	57	343	162	0	622
小計	14,753	1,855	1,952	6,035	2,666	4	2,241
合計	42,031	4,017	5,456	16,375	8,525	15	7,643

※総合判定なし…94名

総合判定区分内訳



2 - 2 項目別判定区分内訳

腹囲測定、聴力検査、胸部X線検査、血糖検査、心電図検査では、おおよそ年齢の上昇に伴い有所見率が増加する傾向が見られた。

血圧測定の有所見率は15.3%（男性17.7%、女性10.9%）で昨年の有所見率14.2%（男性16.7%、女性9.9%）より1.1ポイント増加した。男性は60～64歳でピークを迎える一方で、女性はおおよそ年齢とともに上昇し、65歳以上で最も高くなった。

貧血の有所見率は男性9.7%、女性20.8%と、女性の有所見率が約2.1倍高くなった。男性の有所見率はU字型に推移し、女性は40～44歳をピークに山型となった。

肝機能の有所見率は男性22.4%、女性6.4%と、男性の有所見率が約3.5倍高くなった。男性は45～49歳をピークに山型となり、女性は50歳以上でやや高めに推移している。

血中脂質の有所見率は28.0%（男性30.0%、女性24.2%）で、昨年の有所見率26.7%（男性29.4%、女性22.0%）より1.3ポイントの増加となった。男性は50～54歳をピークに山型となったが、女性は60～64歳にピークを迎えた。

尿糖検査、尿蛋白検査の有所見率は男女ともに1～2%前後の低い割合で推移している。男性はいずれの検査でもおおよそ年齢の上昇に伴い有所見率も上昇。女性は19歳以下の尿蛋白検査で2.1%の高い有所見率を示した他は、年齢との相関は認めなかった。

以下、身体測定・腹囲測定・聴力検査（1000Hz、4000Hz）・胸部X線検査・血圧測定・貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・尿糖検査・尿蛋白検査・心電図検査の順に集計結果を掲載している。

<年齢別判定区分内訳>

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
身体測定									
男性									
～19歳	260	174	0	86	0	0	0	86	33.1%
20～24歳	2,033	1,329	0	704	0	0	0	704	34.6%
25～29歳	2,591	1,675	0	916	0	0	0	916	35.4%
30～34歳	2,571	1,580	0	991	0	0	0	991	38.5%
35～39歳	2,488	1,510	0	978	0	0	0	978	39.3%
40～44歳	2,771	1,668	0	1,103	0	0	0	1,103	39.8%
45～49歳	3,572	2,142	0	1,430	0	0	0	1,430	40.0%
50～54歳	3,526	2,105	0	1,421	0	0	0	1,421	40.3%
55～59歳	2,701	1,633	0	1,068	0	0	0	1,068	39.5%
60～64歳	2,018	1,272	0	746	0	0	0	746	37.0%
65歳～	2,408	1,521	0	887	0	0	0	887	36.8%
小計	26,939	16,609	0	10,330	0	0	0	10,330	38.3%
女性									
～19歳	236	176	0	60	0	0	0	60	25.4%
20～24歳	1,404	959	0	445	0	0	0	445	31.7%
25～29歳	1,372	905	0	467	0	0	0	467	34.0%
30～34歳	1,193	756	0	437	0	0	0	437	36.6%
35～39歳	1,147	752	0	395	0	0	0	395	34.4%
40～44歳	1,383	881	0	502	0	0	0	502	36.3%
45～49歳	1,857	1,239	0	618	0	0	0	618	33.3%
50～54歳	1,866	1,191	0	675	0	0	0	675	36.2%
55～59歳	1,676	1,061	0	615	0	0	0	615	36.7%
60～64歳	1,191	752	0	439	0	0	0	439	36.9%
65歳～	1,192	782	0	410	0	0	0	410	34.4%
小計	14,517	9,454	0	5,063	0	0	0	5,063	34.9%
合計	41,456	26,063	0	15,393	0	0	0	15,393	37.1%
腹囲測定									
男性									
～19歳	128	107	0	21	0	0	0	21	16.4%
20～24歳	1,355	1,076	0	279	0	0	0	279	20.6%
25～29歳	1,735	1,200	0	535	0	0	0	535	30.8%
30～34歳	1,683	1,080	0	603	0	0	0	603	35.8%
35～39歳	1,900	1,175	0	725	0	0	0	725	38.2%
40～44歳	2,564	1,498	0	1,066	0	0	0	1,066	41.6%
45～49歳	3,357	1,855	0	1,502	0	0	0	1,502	44.7%
50～54歳	3,292	1,730	0	1,562	0	0	0	1,562	47.4%
55～59歳	2,532	1,270	0	1,262	0	0	0	1,262	49.8%
60～64歳	1,919	979	0	940	0	0	0	940	49.0%
65歳～	2,349	1,135	0	1,214	0	0	0	1,214	51.7%
小計	22,814	13,105	0	9,709	0	0	0	9,709	42.6%
女性									
～19歳	72	69	0	3	0	0	0	3	4.2%
20～24歳	812	778	0	34	0	0	0	34	4.2%
25～29歳	882	834	0	48	0	0	0	48	5.4%
30～34歳	799	720	0	79	0	0	0	79	9.9%
35～39歳	871	787	0	84	0	0	0	84	9.6%
40～44歳	1,298	1,165	0	133	0	0	0	133	10.2%
45～49歳	1,753	1,560	0	193	0	0	0	193	11.0%
50～54歳	1,748	1,508	0	240	0	0	0	240	13.7%
55～59歳	1,576	1,350	0	226	0	0	0	226	14.3%
60～64歳	1,126	948	0	178	0	0	0	178	15.8%
65歳～	1,151	965	0	186	0	0	0	186	16.2%
小計	12,088	10,684	0	1,404	0	0	0	1,404	11.6%
合計	34,902	23,789	0	11,113	0	0	0	11,113	31.8%

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
聴力1000Hz検査									
男性									
～19歳	140	139	0	1	0	0	0	1	0.7%
20～24歳	1,434	1,413	0	21	0	0	0	21	1.5%
25～29歳	1,811	1,788	0	23	0	0	0	23	1.3%
30～34歳	1,741	1,724	0	17	0	0	0	17	1.0%
35～39歳	1,989	1,964	0	25	0	0	0	25	1.3%
40～44歳	2,576	2,526	0	50	0	0	0	50	1.9%
45～49歳	3,359	3,271	0	88	0	0	0	88	2.6%
50～54歳	3,285	3,151	0	134	0	0	0	134	4.1%
55～59歳	2,531	2,391	0	140	0	0	0	140	5.5%
60～64歳	1,917	1,743	0	174	0	0	0	174	9.1%
65歳～	2,337	1,807	0	530	0	0	0	530	22.7%
小計	23,120	21,917	0	1,203	0	0	0	1,203	5.2%
女性									
～19歳	127	124	0	3	0	0	0	3	2.4%
20～24歳	930	917	0	13	0	0	0	13	1.4%
25～29歳	923	914	0	9	0	0	0	9	1.0%
30～34歳	857	844	0	13	0	0	0	13	1.5%
35～39歳	917	897	0	20	0	0	0	20	2.2%
40～44歳	1,308	1,288	0	20	0	0	0	20	1.5%
45～49歳	1,754	1,711	0	43	0	0	0	43	2.5%
50～54歳	1,757	1,687	0	70	0	0	0	70	4.0%
55～59歳	1,579	1,489	0	90	0	0	0	90	5.7%
60～64歳	1,129	1,054	0	75	0	0	0	75	6.6%
65歳～	1,141	916	0	225	0	0	0	225	19.7%
小計	12,422	11,841	0	581	0	0	0	581	4.7%
合計	35,542	33,758	0	1,784	0	0	0	1,784	5.0%
聴力4000Hz検査									
男性									
～19歳	140	140	0	0	0	0	0	0	0.0%
20～24歳	1,434	1,420	0	14	0	0	0	14	1.0%
25～29歳	1,811	1,790	0	21	0	0	0	21	1.2%
30～34歳	1,741	1,725	0	16	0	0	0	16	0.9%
35～39歳	1,989	1,940	0	49	0	0	0	49	2.5%
40～44歳	2,576	2,458	0	118	0	0	0	118	4.6%
45～49歳	3,359	3,063	0	296	0	0	0	296	8.8%
50～54歳	3,285	2,836	0	449	0	0	0	449	13.7%
55～59歳	2,531	1,992	0	539	0	0	0	539	21.3%
60～64歳	1,917	1,317	0	600	0	0	0	600	31.3%
65歳～	2,337	1,078	0	1,259	0	0	0	1,259	53.9%
小計	23,120	19,759	0	3,361	0	0	0	3,361	14.5%
女性									
～19歳	127	126	0	1	0	0	0	1	0.8%
20～24歳	930	927	0	3	0	0	0	3	0.3%
25～29歳	923	920	0	3	0	0	0	3	0.3%
30～34歳	857	853	0	4	0	0	0	4	0.5%
35～39歳	917	909	0	8	0	0	0	8	0.9%
40～44歳	1,308	1,292	0	16	0	0	0	16	1.2%
45～49歳	1,754	1,719	0	35	0	0	0	35	2.0%
50～54歳	1,757	1,702	0	55	0	0	0	55	3.1%
55～59歳	1,579	1,521	0	58	0	0	0	58	3.7%
60～64歳	1,129	1,060	0	69	0	0	0	69	6.1%
65歳～	1,141	931	0	210	0	0	0	210	18.4%
小計	12,422	11,960	0	462	0	0	0	462	3.7%
合計	35,542	31,719	0	3,823	0	0	0	3,823	10.8%

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
胸部X線検査									
男性									
～19歳	297	291	0	2	4	0	0	6	2.0%
20～24歳	1,787	1,758	0	25	3	1	0	29	1.6%
25～29歳	2,307	2,262	0	38	7	0	0	45	2.0%
30～34歳	2,340	2,278	0	50	12	0	0	62	2.6%
35～39歳	2,249	2,172	0	68	9	0	0	77	3.4%
40～44歳	2,515	2,400	0	101	11	3	0	115	4.6%
45～49歳	3,242	3,067	0	163	11	1	0	175	5.4%
50～54歳	3,180	2,978	0	175	24	3	0	202	6.4%
55～59歳	2,471	2,236	0	214	21	0	0	235	9.5%
60～64歳	1,840	1,643	0	167	28	2	0	197	10.7%
65歳～	2,287	1,873	0	347	64	3	0	414	18.1%
小計	24,515	22,958	0	1,350	194	13	0	1,557	6.4%
女性									
～19歳	239	231	0	8	0	0	0	8	3.3%
20～24歳	1,183	1,158	0	23	2	0	0	25	2.1%
25～29歳	1,209	1,188	0	18	3	0	0	21	1.7%
30～34歳	1,064	1,037	0	24	2	1	0	27	2.5%
35～39歳	1,024	1,005	0	18	1	0	0	19	1.9%
40～44歳	1,278	1,232	0	39	7	0	0	46	3.6%
45～49歳	1,722	1,667	0	43	12	0	0	55	3.2%
50～54歳	1,726	1,643	0	72	8	3	0	83	4.8%
55～59歳	1,511	1,410	0	82	19	0	0	101	6.7%
60～64歳	1,064	970	0	84	9	1	0	94	8.8%
65歳～	1,116	942	0	151	23	0	0	174	15.6%
小計	13,136	12,483	0	562	86	5	0	653	5.0%
合計	37,651	35,441	0	1,912	280	18	0	2,210	5.9%
血圧測定									
男性									
～19歳	260	178	60	19	3	0	0	22	8.5%
20～24歳	2,033	1,309	548	163	10	0	3	173	8.5%
25～29歳	2,591	1,646	710	196	28	0	11	224	8.6%
30～34歳	2,571	1,508	727	239	70	0	27	309	12.0%
35～39歳	2,488	1,360	724	271	58	0	75	329	13.2%
40～44歳	2,771	1,370	773	339	125	0	164	464	16.7%
45～49歳	3,572	1,533	932	552	207	0	348	759	21.2%
50～54歳	3,526	1,278	828	588	245	0	587	833	23.6%
55～59歳	2,700	749	641	433	207	0	670	640	23.7%
60～64歳	2,019	493	409	326	154	0	637	480	23.8%
65歳～	2,407	395	384	368	173	0	1,087	541	22.5%
小計	26,938	11,819	6,736	3,494	1,280	0	3,609	4,774	17.7%
女性									
～19歳	236	195	37	4	0	0	0	4	1.7%
20～24歳	1,404	1,188	184	26	4	0	2	30	2.1%
25～29歳	1,372	1,180	152	29	8	0	3	37	2.7%
30～34歳	1,193	996	150	30	10	0	7	40	3.4%
35～39歳	1,147	853	206	56	18	0	14	74	6.5%
40～44歳	1,382	943	252	99	45	0	43	144	10.4%
45～49歳	1,857	1,149	377	155	76	0	100	231	12.4%
50～54歳	1,866	956	390	217	86	0	217	303	16.2%
55～59歳	1,676	749	370	181	83	0	293	264	15.8%
60～64歳	1,191	479	228	149	64	0	271	213	17.9%
65歳～	1,193	301	221	164	72	0	435	236	19.8%
小計	14,517	8,989	2,567	1,110	466	0	1,385	1,576	10.9%
合計	41,455	20,808	9,303	4,604	1,746	0	4,994	6,350	15.3%

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
貧血検査									
男性									
～19歳	127	63	45	18	1	0	0	19	15.0%
20～24歳	1,380	711	513	148	8	0	0	156	11.3%
25～29歳	1,870	1,063	618	165	23	0	1	188	10.1%
30～34歳	1,991	1,212	620	148	11	0	0	159	8.0%
35～39歳	2,102	1,353	585	140	23	0	1	163	7.8%
40～44歳	2,568	1,727	640	179	22	0	0	201	7.8%
45～49歳	3,364	2,376	709	235	40	0	4	275	8.2%
50～54歳	3,302	2,310	690	241	58	0	3	299	9.1%
55～59歳	2,531	1,766	493	220	52	0	0	272	10.7%
60～64歳	1,916	1,351	341	168	54	0	2	222	11.6%
65歳～	2,343	1,676	335	243	85	0	4	328	14.0%
小計	23,494	15,608	5,589	1,905	377	0	15	2,282	9.7%
女性									
～19歳	60	34	18	5	3	0	0	8	13.3%
20～24歳	830	510	161	113	40	0	6	153	18.4%
25～29歳	992	635	170	132	47	0	8	179	18.0%
30～34歳	970	600	163	150	47	0	10	197	20.3%
35～39歳	1,004	639	139	144	76	0	6	220	21.9%
40～44歳	1,324	800	144	224	134	0	22	358	27.0%
45～49歳	1,780	1,032	230	290	184	0	44	474	26.6%
50～54歳	1,791	1,077	293	281	100	0	40	381	21.3%
55～59歳	1,609	1,030	302	230	40	0	7	270	16.8%
60～64歳	1,152	783	183	156	28	0	2	184	16.0%
65歳～	1,165	763	185	189	24	0	4	213	18.3%
小計	12,677	7,903	1,988	1,914	723	0	149	2,637	20.8%
合計	36,171	23,511	7,577	3,819	1,100	0	164	4,919	13.6%
肝機能検査									
男性									
～19歳	127	104	8	3	12	0	0	15	11.8%
20～24歳	1,380	1,032	147	71	130	0	0	201	14.6%
25～29歳	1,870	1,276	222	129	243	0	0	372	19.9%
30～34歳	1,991	1,248	288	167	288	0	0	455	22.9%
35～39歳	2,102	1,271	310	179	342	0	0	521	24.8%
40～44歳	2,568	1,507	429	241	390	0	1	631	24.6%
45～49歳	3,364	1,873	627	324	539	0	1	863	25.7%
50～54歳	3,302	1,850	606	310	533	0	3	843	25.5%
55～59歳	2,531	1,496	465	202	366	0	2	568	22.4%
60～64歳	1,916	1,178	338	142	254	0	4	396	20.7%
65歳～	2,343	1,526	400	175	233	0	9	408	17.4%
小計	23,494	14,361	3,840	1,943	3,330	0	20	5,273	22.4%
女性									
～19歳	60	58	1	0	1	0	0	1	1.7%
20～24歳	830	792	19	8	11	0	0	19	2.3%
25～29歳	992	916	35	19	21	0	1	40	4.0%
30～34歳	970	880	42	18	30	0	0	48	4.9%
35～39歳	1,004	902	48	24	30	0	0	54	5.4%
40～44歳	1,324	1,203	62	27	31	0	1	58	4.4%
45～49歳	1,780	1,602	78	43	55	0	2	98	5.5%
50～54歳	1,791	1,476	150	62	100	0	3	162	9.0%
55～59歳	1,609	1,300	158	59	91	0	1	150	9.3%
60～64歳	1,152	934	99	63	54	0	2	117	10.2%
65歳～	1,165	993	100	40	30	0	2	70	6.0%
小計	12,677	11,056	792	363	454	0	12	817	6.4%
合計	36,171	25,417	4,632	2,306	3,784	0	32	6,090	16.8%


	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
血中脂質検査									
男性									
～19歳	127	89	18	6	14	0	0	20	15.7%
20～24歳	1,380	856	260	146	114	0	4	260	18.8%
25～29歳	1,870	985	427	286	153	0	19	439	23.5%
30～34歳	1,991	880	523	414	152	0	22	566	28.4%
35～39歳	2,102	888	481	519	164	0	50	683	32.5%
40～44歳	2,568	919	674	676	191	0	108	867	33.8%
45～49歳	3,364	1,061	916	867	266	0	254	1,133	33.7%
50～54歳	3,302	947	861	864	275	0	355	1,139	34.5%
55～59歳	2,531	725	638	637	196	0	335	833	32.9%
60～64歳	1,916	545	473	433	124	0	341	557	29.1%
65歳～	2,343	710	552	425	131	0	525	556	23.7%
小計	23,494	8,605	5,823	5,273	1,780	0	2,013	7,053	30.0%
女性									
～19歳	60	45	7	5	3	0	0	8	13.3%
20～24歳	830	608	103	48	66	0	5	114	13.7%
25～29歳	992	666	148	80	92	0	6	172	17.3%
30～34歳	970	617	171	104	72	0	6	176	18.1%
35～39歳	1,004	616	177	132	75	0	4	207	20.6%
40～44歳	1,324	787	318	152	57	0	10	209	15.8%
45～49歳	1,780	884	443	307	98	0	48	405	22.8%
50～54歳	1,791	683	478	413	102	0	115	515	28.8%
55～59歳	1,609	424	419	426	114	0	226	540	33.6%
60～64歳	1,152	258	260	319	74	0	241	393	34.1%
65歳～	1,165	260	239	281	53	0	332	334	28.7%
小計	12,677	5,848	2,763	2,267	806	0	993	3,073	24.2%
合計	36,171	14,453	8,586	7,540	2,586	0	3,006	10,126	28.0%
血糖検査									
男性									
～19歳	127	110	14	2	0	0	1	2	1.6%
20～24歳	1,380	1,243	113	16	5	0	3	21	1.5%
25～29歳	1,870	1,596	228	33	7	0	6	40	2.1%
30～34歳	1,991	1,626	288	43	17	0	17	60	3.0%
35～39歳	2,102	1,576	384	75	27	0	40	102	4.9%
40～44歳	2,568	1,766	572	135	45	0	50	180	7.0%
45～49歳	3,364	2,045	899	222	89	0	109	311	9.2%
50～54歳	3,302	1,748	956	297	111	0	190	408	12.4%
55～59歳	2,531	1,156	754	278	106	0	237	384	15.2%
60～64歳	1,916	788	569	260	94	0	205	354	18.5%
65歳～	2,343	741	748	367	148	0	339	515	22.0%
小計	23,494	14,395	5,525	1,728	649	0	1,197	2,377	10.1%
女性									
～19歳	60	55	4	1	0	0	0	1	1.7%
20～24歳	830	764	53	10	1	0	2	11	1.3%
25～29歳	992	897	78	12	1	0	4	13	1.3%
30～34歳	970	839	103	17	5	0	6	22	2.3%
35～39歳	1,004	836	126	23	12	0	7	35	3.5%
40～44歳	1,324	1,040	225	36	11	0	12	47	3.5%
45～49歳	1,780	1,311	354	66	12	0	37	78	4.4%
50～54歳	1,791	1,118	507	95	27	0	44	122	6.8%
55～59歳	1,609	905	475	141	29	0	59	170	10.6%
60～64歳	1,152	550	407	110	22	0	63	132	11.5%
65歳～	1,165	483	410	149	30	0	93	179	15.4%
小計	12,677	8,798	2,742	660	150	0	327	810	6.4%
合計	36,171	23,193	8,267	2,388	799	0	1,524	3,187	8.8%

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
尿糖検査									
男性									
～19歳	260	258	0	0	0	0	2	0	0.0%
20～24歳	2,033	2,014	11	0	5	0	3	5	0.2%
25～29歳	2,591	2,548	19	0	17	0	7	17	0.7%
30～34歳	2,571	2,520	8	0	21	0	22	21	0.8%
35～39歳	2,486	2,397	17	0	28	0	44	28	1.1%
40～44歳	2,767	2,634	32	0	47	0	54	47	1.7%
45～49歳	3,572	3,342	54	0	59	0	117	59	1.7%
50～54歳	3,522	3,164	73	0	84	0	201	84	2.4%
55～59歳	2,694	2,316	56	0	64	0	258	64	2.4%
60～64歳	2,016	1,699	45	0	54	0	218	54	2.7%
65歳～	2,404	1,910	57	0	80	0	357	80	3.3%
小計	26,916	24,802	372	0	459	0	1,283	459	1.7%
女性									
～19歳	235	233	1	0	0	0	1	0	0.0%
20～24歳	1,402	1,391	7	0	2	0	2	2	0.1%
25～29歳	1,370	1,351	7	0	8	0	4	8	0.6%
30～34歳	1,190	1,172	5	0	6	0	7	6	0.5%
35～39歳	1,146	1,127	4	0	8	0	7	8	0.7%
40～44歳	1,382	1,350	5	0	10	0	17	10	0.7%
45～49歳	1,853	1,803	7	0	6	0	37	6	0.3%
50～54歳	1,866	1,800	5	0	14	0	47	14	0.8%
55～59歳	1,676	1,597	9	0	7	0	63	7	0.4%
60～64歳	1,190	1,117	2	0	6	0	65	6	0.5%
65歳～	1,192	1,080	7	0	8	0	97	8	0.7%
小計	14,502	14,021	59	0	75	0	347	75	0.5%
合計	41,418	38,823	431	0	534	0	1,630	534	1.3%
尿蛋白検査									
男性									
～19歳	260	244	14	2	0	0	0	2	0.8%
20～24歳	2,033	1,972	41	12	7	0	1	19	0.9%
25～29歳	2,591	2,538	35	11	3	0	4	14	0.5%
30～34歳	2,571	2,526	21	11	7	0	6	18	0.7%
35～39歳	2,486	2,431	34	11	5	0	5	16	0.6%
40～44歳	2,767	2,696	35	14	10	0	12	24	0.9%
45～49歳	3,572	3,483	40	23	18	0	8	41	1.1%
50～54歳	3,522	3,424	36	25	24	0	13	49	1.4%
55～59歳	2,694	2,583	40	14	34	0	23	48	1.8%
60～64歳	2,016	1,924	23	18	25	0	26	43	2.1%
65歳～	2,404	2,246	48	24	44	0	42	68	2.8%
小計	26,916	26,067	367	165	177	0	140	342	1.3%
女性									
～19歳	235	211	18	4	1	0	1	5	2.1%
20～24歳	1,402	1,357	26	9	8	0	2	17	1.2%
25～29歳	1,370	1,336	21	7	5	0	1	12	0.9%
30～34歳	1,190	1,173	9	5	1	0	2	6	0.5%
35～39歳	1,146	1,116	16	11	1	0	2	12	1.0%
40～44歳	1,382	1,347	27	7	1	0	0	8	0.6%
45～49歳	1,853	1,803	30	9	3	0	8	12	0.6%
50～54歳	1,866	1,825	22	8	5	0	6	13	0.7%
55～59歳	1,676	1,652	9	5	1	0	9	6	0.4%
60～64歳	1,190	1,158	15	6	5	0	6	11	0.9%
65歳～	1,192	1,175	7	6	1	0	3	7	0.6%
小計	14,502	14,153	200	77	32	0	40	109	0.8%
合計	41,418	40,220	567	242	209	0	180	451	1.1%


	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
心電図検査									
男性									
～19歳	117	73	31	10	3	0	0	13	11.1%
20～24歳	1,234	826	300	98	9	0	1	107	8.7%
25～29歳	1,638	1,146	334	136	21	0	1	157	9.6%
30～34歳	1,683	1,204	336	128	13	0	2	141	8.4%
35～39歳	1,903	1,386	309	169	31	0	8	200	10.5%
40～44歳	2,537	1,838	414	234	38	0	13	272	10.7%
45～49歳	3,322	2,332	528	350	77	0	35	427	12.9%
50～54歳	3,271	2,200	546	372	87	0	66	459	14.0%
55～59歳	2,522	1,554	405	375	120	0	68	495	19.6%
60～64歳	1,910	1,082	329	293	108	0	98	401	21.0%
65歳～	2,345	1,099	372	530	177	0	167	707	30.1%
小計	22,482	14,740	3,904	2,695	684	0	459	3,379	15.0%
女性									
～19歳	59	39	16	2	2	0	0	4	6.8%
20～24歳	734	483	181	64	3	0	3	67	9.1%
25～29歳	870	590	188	85	4	0	3	89	10.2%
30～34歳	844	533	208	88	14	0	1	102	12.1%
35～39歳	906	581	170	143	10	0	2	153	16.9%
40～44歳	1,295	842	248	180	20	0	5	200	15.4%
45～49歳	1,748	1,100	336	274	31	0	7	305	17.4%
50～54歳	1,748	1,050	321	302	63	0	12	365	20.9%
55～59歳	1,573	949	285	265	54	0	20	319	20.3%
60～64歳	1,121	644	219	191	52	0	15	243	21.7%
65歳～	1,147	613	226	226	53	0	29	279	24.3%
小計	12,045	7,424	2,398	1,820	306	0	97	2,126	17.7%
合計	34,527	22,164	6,302	4,515	990	0	556	5,505	15.9%

＜年齢別有所見率＞


〔身体測定〕




〔腹囲測定〕




[聴力1000Hz検査]




[聴力4000Hz検査]




[胸部X線検査]




[血圧測定]




[貧血検査]




[肝機能検査]




〔血中脂質検査〕




〔血糖検査〕




[尿糖検査]



[尿蛋白検査]



[心電図検査]



3. 特殊健康診断実施概要


(学生健康診断含む)

- 3-1 受診者数
- 3-2 判定区分
- 3-3 基準値一覧

3-1 受診者数

特殊健康診断（学生含む）受診者数 ※延べ数

業務内容	受診者数
法定健康診断	
有機溶剤	4,152
鉛	465
電離放射線	475
高気圧業務	9
特定化学物質	2,634
特別有機溶剤	1,733
石綿	345
じん肺	956
指導勧奨による健康診断	
紫外線、赤外線	273
騒音作業	2,148
沃素	0
超音波溶着機	7
情報機器作業	209
振動業務	114
引金付工具	0
レーザー機器	24
計	13,544



3-2 判定区分

特殊健康診断は、問診を含む実施したすべての検査項目及び以前の検査結果から総合的に判定されます。よって、基準値内であっても総合判定で要経過観察となる場合や、わずかに基準値外であっても異常なしとなる場合もあります。

＜各特殊健康診断の判定＞

〔有機溶剤・鉛・電離放射線等の健康診断〕

異常なし : 健康診断の結果、異常は認められませんでした。
 要経過観察 : 健康診断の結果に僅かな異常を認めますが、6ヶ月（または1年）毎の健康診断で経過をみていきましょう。気になる症状があれば、産業医へ相談または医療機関を受診してください。
 要精密検査 : 健康診断の結果に異常を認めます。精密検査を受けてください。
 要治療 : 健康診断の結果、治療が必要であると判断されました。早めの医療機関受診をお勧めします。

〔特定化学物質・石綿・高気圧業務等の健康診断〕

異常なし : 一次健康診断の結果、異常は認められませんでした。
 要経過観察 : 一次健康診断の結果に僅かな異常を認めますが、二次健康診断は必要ないと判断されました。気になる症状があれば、産業医へ相談または医療機関を受診してください。
 要再検査 : 一次健康診断の結果に異常を認めますので医療機関の受診をお勧めします。二次健康診断の実施等についてのご判断は産業医に相談下さい。
 要二次健康診断 : 一次健康診断の結果、二次健康診断が必要であると判断されました。

〔じん肺健康診断〕

じん肺関連所見なし : 胸部X線撮影検査の結果、じん肺の陰影は認められない又はきわめて僅かなものでした。
 じん肺所見ありかつ合併症なし : 胸部X線撮影検査の結果、じん肺の陰影を認めます。胸部臨床検査から合併症は認められません。肺機能検査を受け、所轄の労働局長による管理区分決定が必要です。
 じん肺所見ありかつ肺結核の合併症疑い : 胸部X線撮影検査の結果、じん肺の陰影を認めます。胸部臨床検査から肺結核の合併が疑われます。結核精密検査を受け、所轄の労働局長による管理区分決定が必要です。
 じん肺所見ありかつ肺結核以外の合併症疑い : 胸部X線撮影検査の結果、じん肺の陰影を認めます。胸部臨床検査からは肺結核以外の合併症が疑われます。省令で定める検査を受け、所轄の労働局長による管理区分決定が必要です。

〔騒音作業健康診断〕

健常者 : 健康診断の結果、異常は認められませんでした。
 要観察者（前駆期） : 前駆期の症状が認められます。
 要観察者（軽度聴力低下） : 軽度の聴力低下が認められます。
 要管理者（中等度以上聴力低下） : 中等度以上の聴力低下が認められます。

3 - 3 基準値一覧

<血液検査>

項目			基準値
血球検査	白血球数(/ μ L)		3100～8400
	白血球百分率	リンパ球(%)	20.0～51.0
		単球(%)	2.0～12.0
		異型リンパ球(%)	0
		好中球(%)	35.0～73.0
		好酸球(%)	0～10.0
		好塩基球(%)	0～3.0
		赤血球数(10^4 / μ L)	男
	女		360～489
	血色素量(g/dL)	男	13.1～16.3
		女	12.1～14.5
	ヘマトクリット(%)	男	38.0～48.9
		女	34.0～43.9
	血小板数(10^4 / μ L)		14.5～32.9
肝機能検査	AST[GOT](U/L)		30以下
	ALT[GPT](U/L)		30以下
	γ -GT[γ -GTP](U/L)		50以下
	総ビリルビン(mg/dL)		1.1以下
	ALP(U/L) ^{※1}		119以下
鉛(μ g/dL)			20.0以下
カドミウム(μ g/dL)			0.5以下
血清インジウム(μ g/L)			3.0以下
血清シアル化糖鎖抗原KL-6(U/mL)			499以下

※1 IFCC法。

<尿検査>

項目		基準値	
一般検査	糖	(－)	
	蛋白	(－)	
	潜血	(－)	
	ウロビリノーゲン	(±)	
代謝物 (使用物質)		基準値	
代謝物検査	有機溶剤	メチル馬尿酸(g/L) (キシレン)	0.5以下
		Nメチルホルムアミド(mg/L) (N,N-ジメチルホルムアミド)	10.0以下
		トリクロロ酢酸(mg/L) (1,1,1-トリクロロエタン)	3.0以下
		馬尿酸(g/L) (トルエン)	1.00以下
		2,5-ヘキサンジオン(mg/L) (ノルマルヘキサン)	2.0以下
	特化物	マンデル酸及びフェニルグリタリ酸総量(g/L) (スチレン)	0.43以下
		マンデル酸(g/L) (エチルベンゼン)	0.3以下
		トリクロロ酢酸(mg/L) (トリクロロエチレン)	30.0以下
		トリクロロ酢酸(mg/L) (テトラクロロエチレン)	3.0以下
		β ₂ -ミクログロブリン(μg/dL) (カドミウム)	289以下
デルタアミノレブリン酸(mg/L) (鉛)		5.0以下	

<血圧測定>

血圧	基準値
収縮期血圧(mmHg)	129 以下
拡張期血圧(mmHg)	84 以下

<眼底検査>

所見	基準値
H, S	0度
その他所見	なし

1. H所見：高血圧性変化

2. S所見：細動脈硬化性変化

<じん肺検査>（胸部X線検査）

小陰影の区分(粒状影・不整形陰影)	
0/-	じん肺検査の陰影が認められないもの又は認められてもきわめて僅かなもの
0/0	
0/1	

<肺機能検査>

検査内容	基準値
1秒率(%)	70以上
%肺活量(%)	80以上

<気導純音聴力検査>

音域	基準値
会話音域 1000Hz(dB)	30未満
高音域 4000Hz(dB)	30未満

<運動機能検査>（チェーンソー・振動工具の取り扱い業務等）

検査内容		基準値	
		利き手	非利き手
瞬発握力(kg)	男	40.1以上	35.1以上
	女	25.1以上	23.1以上
維持握力(kg)		5.4以下	

1. 瞬発握力：左右交互に5回測定し、1回目及び2回目のうち大きい方の値。

2. 維持握力：左右交互に5回測定し、1回目及び2回目のうち大きい方の値と4回目及び5回目のうち小さい方の値との差。

4 . 特殊健康診断結果集計

(学生健康診断含む)

4 - 1 判定区分内訳

4 - 2 測定対象物質の検査分布

4 - 1 判定区分内訳

<法定健康診断>

	異常なし	要経過観察	要精密検査	要治療	計
有機溶剤	3,868	284	0	0	4,152
鉛	451	14	0	0	465
電離放射線	432	38	5	0	475

	異常なし	要経過観察	要再検査	要二次健診	計
高気圧業務	8	1	0	0	9
ニッケル	73	0	0	0	73
ベリリウム	0	0	0	0	0
アクリルアミド	15	0	0	0	15
五酸化バナジウム	5	0	0	0	5
塩素	0	0	0	0	0
カドミウム	21	6	0	0	27
クロム酸	139	8	0	0	147
水銀	7	1	0	0	8
弗化水素	79	1	0	0	80
ベンゼン	30	6	0	0	36
マンガン	1,256	60	0	0	1,316
硫化水素	10	0	0	0	10
砒素	9	0	0	0	9
シアン	117	5	0	0	122
コバルト	436	13	0	0	449
R C F	137	23	1	0	161
インジウム	25	0	0	0	25
三酸化ニアンチモン	56	3	0	0	59
酸化プロピレン	3	0	0	0	3
M O C A	19	8	0	0	27
ナフタレン	54	4	4	0	62
オルトトルイジン	0	0	0	0	0
エチレンジミン	0	0	0	0	0
特別有機溶剤	1,275	458	0	0	1,733
石綿	330	14	1	0	345

	所見なし	じん肺所見あり	所見+肺結核	所見+合併症	計
じん肺	949	0	0	7	956

＜指導勧奨による健康診断＞

	異常なし	要経過観察	要再検査	要二次健診	計
振動業務	31	83	0	0	114

	異常なし	要経過観察	要精密検査	要治療	計
紫外線、赤外線	271	2	0	0	273
沃素	0	0	0	0	0
超音波溶着機	7	0	0	0	7
情報機器作業	134	75	0	0	209
引金付工具	0	0	0	0	0
レーザー機器	19	5	0	0	24

	健常者	要観察前駆期	要観察軽度	要管理者	計
騒音作業	1,620	208	259	61	2,148

4 - 2 測定対象物質の検査分布

対象物質		分布 1	分布 2	分布 3	計
有機溶剤					
キシレン	メチル馬尿酸	1,230	1	1	1,232
N,N-ジメチルホルムアミド	Nメチルホルムアミド	211	0	0	211
1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロ酢酸	4	0	0	4
トルエン	馬尿酸	1,847	73	1	1,921
ノルマルヘキサン	2,5-ヘキサンジオン	444	1	0	445
特定化学物質					
エチルベンゼン	マンデル酸	769	2	0	771
テトラクロロエチレン	トリクロロ酢酸	7	0	0	7
トリクロロエチレン	トリクロロ酢酸	50	1	2	53
鉛					
	血中鉛	669	4	0	673
	デルタアミノレブリン酸	673	0	0	673

5. 異常値等の緊急連絡

5 - 1 項目別緊急連絡件数

5 - 1 項目別緊急連絡件数


<血液検査>

項目	総蛋白	白血球数	血色素量	血小板数	AST[GOT]	ALT[GPT]
件数	0	3	1	5	1	1

γ-GT[γ-GTP]	中性脂肪	血糖	HbA1c	総ビリルビン	クレアチニン	アミラーゼ
9	41	2	29	0	2	1

<その他>

項目	血压	心電図	胸部X線	胃部X線	眼底	腹部超音波
件数	371	11	6	0	0	0



ストレスチェック結果報告

1. 職業性ストレス簡易調査実施概要

1 - 1 実施事業所数

1 - 2 受検者数

1-1 実施事業所数

職業性ストレス簡易調査実施事業所数

事業所数…128事業所


1-2 受検者数

職業性ストレス簡易調査受検者数

令和5年度のストレスチェックの申込者数15,932人の中で、各質問項目に未回答がない有効回答者数は、男性6,093人、女性5,186人、計11,279人（有効回答率70.8%）であった。これを年齢階級別でみると、男女ともに50歳代の受検者が最も多く、受検者の平均年齢は男性46.0歳、女性46.1歳となっている。

	総数	平均年齢
男性	6093	46.0
女性	5186	46.1
総計	11279	

職業性ストレス簡易調査性別・年齢別構成



※受検者数には一部集計に含まれていない事業所があります。

2. 職業性ストレス簡易調査結果集計

2－1 性別高ストレス者

2－2 年齢別高ストレス者

2－3 業種別高ストレス者


職業性ストレス簡易調査における高ストレス者の割合は18.2%（男性18.6%、女性17.8%）となり、令和4年度の高ストレス者の割合17.4%（男性17.7%、女性17.1%）と比較して、0.8ポイントの増加となった。

（公社）全国労働衛生団体連合会会員が実施した職業性ストレス簡易調査（有効回答者数1,395,057人）の統計によると、令和4年度の高ストレス者の割合は14.9%（男性16.6%、女性12.4%）となっており、弊会集計の事業所の方が高ストレス者の割合が高い結果となった。また、両調査とも男性の方が、高ストレス者の割合がやや高い結果となっている。

2-1 性別高ストレス者

高ストレス者の割合	
男性	18.6%
女性	17.8%
総計	18.2%

2-2 年齢別高ストレス者



2-3 業種別高ストレス者

高ストレス者の割合 非高ストレス者の割合		
男性		
サービス業	15.7%	84.3%
医療・福祉	19.4%	80.6%
運輸・郵便業	9.5%	90.5%
建設業	9.5%	90.5%
公務	15.6%	84.4%
製造業	20.6%	79.4%
女性		
サービス業	14.6%	85.4%
医療・福祉	17.5%	82.5%
運輸・郵便業	0.0%	100.0%
建設業	16.7%	83.3%
公務	14.3%	85.7%
製造業	21.6%	78.4%

2023 年度事業年報

発行日 2024 年 10 月発行

発行所 一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
松本健診所

長野県松本市神林 7107-55

0263-40-3911